

Vanliga problem under småbarnsåren

Hans Edenwall, BHV-enheten, Karlskrona

Elisabet Ekman, Jämfö vårdcentral, Jämfö

Inledning

Barnhälsovården (BHV) har en lång tradition i Sverige. I början av 1900-talet var det mest en filantropisk verksamhet som byggde på privata initiativ, men 1937 började uppbyggnaden av offentligt finansierade barnvårdscentraler (BVC) över hela landet. Från att ha varit en medicinskt inriktad verksamhet har den moderna barnhälsovården alltmer utvecklats till att vara ett föräldrastöd, arbeta med hälsorådgivning och inriktas mot en hälsofrämjande verksamhet. Sjuksköterskan är nyckelperson i barnhälsovården men såväl sjuksköterskans som läkarens arbete har förändrats och blivit ett teamarbete. I teamet ingår också BHV-psykologer och till verksamheten är ofta även dietister, logopedier och tandvården kopplade. Barnhälsovården har en unik position i Sverige, då den vänder sig till alla barn i åldern 0–6 år och praktiskt taget alla barn kommer dit.

I detta kapitel behandlas några vanliga problem där den första bedömningen och handläggningen ofta sker inom primärvården eller på BVC. Bra webbplatser för barn och vardagspediatrik inom barnhälsovården är 1177 Vårdguiden och på Rikshandboken i barnhälsovård. Till dessa sidor kan också föräldrar hänvisas.

Normal uppfödning av spädbarn

Den första tiden är bröstmjölken barnets bästa näring och räcker, tillsammans med D-vitamin, som enda näringskälla under barnets första 6 månader. Bröstmjölken har en för det enskilda barnet speciellt anpassad sammansättning av näring, energi och immunglobuliner. Bröstmjölken bidrar till skydd mot infektioner i tarm och luftvägar, och förstoppning är ovanligare hos bröstbarn än hos flaskuppfödda. Frekvensen av plötslig spädbarnsdöd är lägre hos ammade barn (1). Helamning rekommenderas i 6 månader och detta är ett önskvärt mål, men delamning liksom amning av kortare längd, är också värdefull. Ett matintresserat barn som är mellan 4 och 6 månader gammalt kan erbjudas smaksensationer från familjens mat, dock aldrig så mycket att det konkurrerar ut bröstmjolk eller bröstmjölksersättning. Efter 6 månaders ålder bör amningen av näringsmässiga skäl kompletteras med annan föda, men det är fördelaktigt om bröstmjölken utgör en del av kosten under hela första levnadsåret eller längre.

Vissa föräldrar vill eller kan inte amma. Dessa föräldrar ska förstås ha samma stöd av barnhälsovården. Det är en fördel om flaskmatning sker under så amningslika förhållanden som möjligt med hud-mot-hud-kontakt, ögonkontakt och liknande.

Vid amningsproblem som inte kan lösas eller då det finns skäl att inte amma, utgör komjölksbaserad bröstmjölksersättning ett bra alternativ till bröstmjolk. Till barn från allergiska högriskfamiljer (då båda föräldrarna har omfattande och behandlingskrävande allergi) rekommenderas komjölkshydrolysat under de första 4 månaderna, eftersom detta kan minska risken för utveckling av komjölksallergi.

Mjolk som dryck bör inte introduceras före 12 månaders ålder.

Amningsproblem

Ömma och såriga bröstvårtor

- Kontrollera amningstekniken. Barnet ska ha hela bröstvårtan och större delen av vårtgården i munnen då det suger.
- Smörj in bröstvårtan med bröstmjolk både före och efter amning. Låt lufttorka. Detta är även bra att göra förebyggande. Undvik att tvätta bröstvårtan med tvål.

Svampinfektion

Om bröstvårtan och vårtgården är inflammerade och ömma, både under och mellan amningarna, kan svampinfektion misstänkas. Barnet har ofta samtidigt vita beläggningar i munnen, så kallad torsk.

- Vid lindriga besvär kan både mor och barn behandlas med vichyvatten lokalt 6–8 gånger/dag.
- Vid mer utbredd infektion ges nystatin mixtur 1 ml 4 gånger/dag till barnet och imidazolderivat lokalt under 10 dagar till modern. Hjälper inte detta kan peroral behandling med flukonazol 50 mg 1 gång/dag i 7 dagar till modern bli aktuell.

Mjolkstockning

Mjolkstockning uppstår när en eller flera mjölkgångar blir tilltäppta på grund av att bröstet inte tömts ordentligt. Man finner en eller flera, ibland ömmande, knölar i bröstet. Ibland är dessa områden röda och värmeökade.

Vid mjölkstockning bör den ammande kvinnan kontrollera amningstekniken och amma oftare än vanligt. Brösten bör masseras i riktning mot bröstvårten när barnet suger och bröstet bör hållas varma. Om barnet ammas är amning bästa sättet att tömma bröstet. Om barnet inte ammas, fungerar bröstpump alldeles utmärkt.

Mastit/bröstböld

Misstänk mastit/bröstböld om smärta och feber tillkommer vid mjölkstockning. Utöver behandling enligt ovan, ge smärtstillande (paracetamol i dosering enligt produktresumé/Fass) och ta ställning till antibiotikabehandling. För behandling, se kapitlet Sjukdomar i bröstkörteln, avsnittet Mastit samt bröstknölar hos gravida.

Kolik hos spädbarn

Kolik hos spädbarn (tremånaderskolik) förekommer från ungefär 2 veckors upp till 4 månaders ålder men kan ibland hålla på längre. Barnet skriker oftast på eftermiddagen och kvällen. För att diagnosen ska kunna sättas brukar man ange att skriken ska pågå i mer än 2–3 timmar/dygn och under minst 3 dagar/vecka. Tillståndet är vanligt och förekommer hos cirka 15 % av alla spädbarn. Mellan skrikperioderna ter sig barnet friskt. Vid undersökning hittas ingen annan orsak till skriken och tillväxtkurvan är normal.

Tremånaderskolik har flera orsaker. Matningsteknik och komjölksproteinallergi är vanliga orsaker. Ännu inte helt färdigutvecklad tarm har diskuterats som orsak, liksom att mängden laktobaciller är mindre i tarmen hos barn med kolik.

Behandling

Behandlingen består till stor del av råd och stöd. Tillståndet är ofarligt och går ofta relativt snart över. Råd om matningsteknik kan ges, som att barnet ska äta långsammare och fås att rapa. Kroppskontakt och spädbarnsmassage (se 1177 Vårdguiden) har ofta god effekt. Komjölksfri kost för såväl den ammande modern som för det flaskuppfödda barnet bör prövas då 25–30 % av kolikbarnen har komjölksallergi. Effekt brukar ses inom 2 veckor. Sempers magdroppar kan prövas. Sempers magdroppar innehåller mjölksyrebakterier som anses hjälpa mot kolik. Några studier ger visst stöd för detta (2, 3). En Cochrane-genomgång pågår under 2018.

Dimetikon har använts i många år men har inte mer effekt än placebo. Akupunktur har prövats men mer forskning behövs för att säkerställa effekten.

Kräkningar

Överskottskräkningar är ett fysiologiskt tillstånd. Barnet ter sig friskt och har normal viktutveckling. Kräkningarna kommer efter måltid och behöver vanligtvis inte behandlas.

Sprutande kräkningar under de första levnadsmånaderna kan vara orsakade av en pylorusstenos. Dessa barn ser inte ut att må bra och har dålig viktutveckling. Barnet ska remitteras direkt till barnklinik eller barnkirurgisk klinik för kirurgisk åtgärd.

Akut tillkommande kräkningar kan vara en infektion. Vinterkräksjuka, gastroenterit, luftvägsinfektion, urinvägsinfektion eller annan infektion kan vara orsaken. Glöm inte att kräkningar och buksmärter hos barn med känd diabetes är ketoacidosis tills motsatsen är bevisad, se Faktaruta 1! Allmäntillståndet och hydreringsgraden avgör handläggningen. Vid oklarheter i diagnostik eller behandling gäller liberala indikationer för remiss till barnklinik.

Mer långdragna kräkningar kan vara orsakade av födoämnesallergi eller -intolerans. Tillväxtkurvan behöver inte vara påverkad. Aktuella födoämnen är komjolk, gluten eller annat födoämne som barnet utsätts för.

Kraftiga kräkningar hos ett skrikigt och/eller allmänpåverkat barn kan vara orsakade av invagination. Barnet blir då dåligt under skrik till skillnad från vid otit, kolik och liknande. Vid misstanke om invagination ska barnet remitteras akut till barnklinik.

Gallfärgade kräkningar kan orsakas av missbildning i mag-tarmkanalen.

Faktaruta 1. Kräkningar/buksmärta hos barn med diabetes

Kräkningar och buksmärter hos barn med känd diabetes är ketoacidosis tills motsatsen är bevisad!

Diarré

Bröstbarn kan tömma sin tarm 7–8 gånger dagligen eller så sällan som en gång i veckan. Gott allmäntillstånd och normal viktkurva talar för ett friskt barn.

Gastroenterit orsakas ofta av rota- eller adenovirus. Allmäntillståndet och hydreringsgraden avgör handläggningen. Vätskeersättning (se kapitlet Infektioner i mag-tarmkanalen, avsnittet Behandling av akut gastroenterit) som ges i små mängder är ofta ett bra alternativ för egenvård. Fortsätt amma eller ge bröstmjolk med sked.

Långdragen diarré kan orsakas av födoämnesallergi eller -intolerans.

Funktionell småbarnsdiarré kallas ett tillstånd som kännetecknas av pigga barn, oftast några år gamla, med diarré och ofta till synes osmält mat i avföringen men med en normal viktkurva. Besvären brukar förbättras med ökad mängd fett i maten och minskad mängd fibrer liksom mindre mängder frukt och bär.

Förstoppning

Spädbarn som får mjölkersättning kan drabbas av förstoppningstendens som kan kräva behandling. Liksom vid förstoppning hos äldre barn sker behandling med laktulos eller genom att öka mängden fibrer i maten. Mjölkersättning som innehåller laktulos kan köpas på apotek. Smakportioner med frukt kan ges för att öka mängden fibrer i maten.

För att motverka förstoppning behövs regelbundna toalettvanor. Exempel på detta är pottråning med toalettbesök vid samma tid varje dag, gärna strax efter måltid, med tillräcklig tid avsatt (läs gärna en saga när barnet sitter på pottan) och viss avskildhet. Regelbunden fysisk aktivitet, fibrer från frukt, grönsaker och grövre mjölksorter liksom adekvata vätskemängder utan att mjölmängden blir för stor, motverkar också förstoppning.

Ett barn med etablerad förstoppning kan behöva snabbverkande lavemang som sorbitol, bisakodyl eller laurylsulfat. Detta kan behöva upprepas dagligen under en kortare tid för att barnet ska vänjas vid daglig tarmtömning. Låt det inte gå mer än tre dygn mellan tarmtömningarna (spontana eller inducerade) för att motverka smärtsamma defekationer med risk för fekalombildning.

Osmotiskt verkande medel som laktulos och laktitol kan behövas dagligen under en längre tid för att motverka ny förstoppning. Andra alternativ är saliniskt aktiva medel som polyetylen glykol (makrogol). I form av Forlax Junior kan det ges från 6 månaders ålder. Det är viktigt att utvärdera effekten. Tänk då på att alltför lös avföring inte ger någon känsla av defekationsbehov och därmed motverkar barnets fortsatta pottråning.

Komjölksöverkänslighet

Komjölksallergi

En vanlig anledning till komjölksöverkänslighet hos förskolebarn i Sverige är komjölksproteinallergi. Detta förekommer hos 2 % av svenska barn och kan övervägas redan i tidig spädbarnsålder, även om barnet ammas helt. Snabballergiska symtom kan vara kräkningar, diarré, nässelutslag, andningsbesvär, klåda och anafylaxi. Sensymtom, vanligast i åldern 6–18 månader, kan komma först timmar till dygn efter mjölkintag och kan bestå av eksem, kräkningar, buksmärtor, sömnstörningar och ibland även avplaning av tillväxtkurvan.

Pricktest och analys av specifika IgE-antikroppar ger ingen säker diagnos. Oftast krävs total elimination av allt komjölksprotein under minst 2 men helst 4 veckor, eventuellt följt av provokation, för att ställa diagnos. För att försäkra sig om att eliminationen av komjölksprotein blir total, är dietistinsats mycket viktig, detta också för att utvärdera behovet av ett eventuellt kalciumtillskott.

Komjölksallergin har i 60 % av fallen försvunnit vid 2–3 års ålder. Reintroduktion av mjölkprotein kan testas var 6:e månad i hemmet, såvida inte tidigare symtom varit allvarliga med anafylaxi. Då bör uppföljningen ske på barnklinik.

Laktosintolerans

Laktasbrist gör att laktos inte kan spjälkas till glukos och galaktos. Detta ger diarré, gasbildning och buksmärtor vid intag av laktos. Globalt utvecklar 60–100 % av befolkningen utanför Nordeuropa och Nordamerika en laktasbrist i skolåldern eller i vuxna ålder. Primär laktosintolerans förekommer hos ungefär 3 % i den vuxna, svenskfödda befolkningen. Laktosintolerans är alltså inget problem i småbarnsåren.

Diagnostik

För diagnostik är oftast laktosreduktion och provokation tillräckligt. Genotypning för adult hypolaktasi kan vara användbar som komplement om utfallet av laktosreduktion och provokation är svårvärderat hos äldre barn eller vuxna.

Behandling

Behandlingen består av minskat laktosintag. Mängden laktos som den enskilda individen klarar av varierar. I vissa situationer kan laktastabletter användas av barnet. Laktosfria eller laktosreducerade produkter fungerar utmärkt för den som är laktosintolerant, men de innehåller vanligen komjölksprotein och fungerar därför inte alls för personer med komjölksallergi.

Celiaki

Celiaki är en immunologisk sjukdom på genetisk grund som innebär en T-cellsmedierad reaktion mot gluten i vete, råg och korn. Detta ger villusatrofi och kronisk inflammation i tunntarmen med malabsorption som följd. Prevalensen varierar mellan olika befolkningar och beräknas ligga på cirka 1/100 i västvärlden med betydligt högre förekomst om en nära släkting är drabbad. Flertalet fall är odiagnostiserade.

Nästantill alla med celiaki har HLA-typerna DQ2/8. HLA-DQ-analys kan användas för att med stor säkerhet utesluta celiaki, men inte för att fastställa diagnosen.

De flesta barn med tydliga symtom på celiaki diagnostiseras under småbarnsåren. Under de första levnadsåren noteras ofta avplaning av viktcurvan och även viktnedgång, stor buk och diarré. Även förstoppning kan förekomma. Något äldre förskolebarn kan få påverkan på längdtillväxten, buksmärtor och gnällighet. Symtomen blir alltmer ospecifika ju äldre barnet är, exempelvis anemi, trötthet, dålig matlust och depression. Celiaki kan också förekomma helt utan symtom.

Celiaki är en livslång sjukdom som går att behandla men inte bota. Det finns även en ökad risk för andra autoimmuna sjukdomar. Obehandlad celiaki ökar risken för ett flertal komplikationer. Hämmad längd- och viktutveckling samt sen pubertet

kan ses om sjukdomen inte behandlas under uppväxtåren. I alla åldrar ses en ökad risk för osteoporos samt järn- och vitaminbrist. I vuxen ålder ses ökad risk för vissa leversjukdomar samt en viss riskökning avseende lymfom i mag-tarmkanalen. Otillräckligt behandlad celiaki ger ofta försämrad livskvalitet i form av trötthet och depression. Mer information finns på webbplatsen för Svenska föreningen för pediatrik gastroenterologi, hepatologi och nutrition.

Diagnostik

Diagnostiken grundar sig på tunntarmsslemhinnans morfologi i biopsipreparat. Då obehandlad celiaki ofta har höga titrar av serumantikroppar av IgA-typ mot gliadin (AGA), endomysium (EMA) och transglutaminas (TGA) kan analys av dessa göras som hjälp i utredningen och uppföljningen. AGA har högst sensitivitet hos barn under 2–4 år medan EMA och TGA har högre sensitivitet över 2–4 års ålder. Både falskt positiva och falskt negativa värden förekommer. Vid IgA-brist är alla IgA-antikroppar låga, även om vederbörande har celiaki. Kom ihåg att höga antikroppstitrar och patologisk biopsi bara finns om barnet äter glutenhaltig mat. Ge därför inte barnet glutenfri mat förrän diagnostiken är klar!

I framtiden kan barn med klassiska symtom komma att diagnostiseras med enbart serologier och klinisk uppföljning, men fortfarande utgör tunntarmsbiopsi grunden för diagnostiken och är ”gylle standard”.

Behandling

Behandlingen består av livslång glutenfri diet. Dietistmedverkan är nödvändig.

Medel vid celiaki, komjölsallergi och laktosintolerans

Livsmedel för särskilda näringsändamål, enligt LVFS 1997:13, kan erhållas på livsmedelsanvisning till barn under 16 år. Förskrivande läkare ska ha specialistbehörighet enligt SOSFS 1979:102. Denna inkluderar specialist i allmänmedicin som tjänstgör på barnvårdscentral (SOSFS 1987:4). För sortiment och priser var god kontakta närmaste apotek.

Övervikt och fetma

Liksom hos vuxna har övervikt och fetma hos barn varit ett tilltagande problem under de senaste decennierna, men öknings-takten har nu visat tecken på att stanna av både hos barn och vuxna. Tidig övervikt och fetma har dock idag sämre prognos än förr om åren. De som idag blir överviktiga och feta redan vid 4 års ålder är i större utsträckning än tidigare även överviktiga och feta som skolbarn, tonåringar och vuxna. Det är därför viktigt att tidigt motverka denna utveckling genom att grundlägga sunda vanor med god kosthållning och regelbunden fysisk aktivitet.

Barn behöver regelbundna måltider – frukost, lunch och middag samt ofta två mellanmål. Från två års ålder bör mat märkt med grönt nyckelhål väljas. Vatten bör vara måltidsdryck och törstsläckare. Minska sockerintaget. Begränsa godis, chips, läsk eller saft och liknande till 1 gång/vecka.

Barn behöver fysisk aktivitet eller lek som gör dem varma och andfädda minst 1 timme varje dag. Denna timme kan delas upp på flera tillfällen. Barn behöver också tid för återhämtning och vila. Längre tids stillasittande ska motverkas och i skolåldern rekommenderas en maximal skärmtid (TV, dator, datorspel m m) på 2 timmar per dag. Se även kapitlet Fetma, avsnittet Behandling av fetma hos barn och ungdomar.

Sömnproblem

Spädbarnet och det lilla barnet ska avnjuta omvärlden i små portioner. Det ska vara balans mellan mat, vila och aktivitet. Föräldrarnas famn och närhet ska vara barnets hamn för anknytning och samspel, trygghet, tillit och vila.

Lättare sömnproblem är vanliga hos spädbarn och småbarn. Fler-talet barn med sömnproblem är helt friska. Hur olika familjer hanterar och tolererar barns sömnstörningar varierar. Föräldrarna behöver, när somatisk orsak uteslutits, få information om hur vanligt tillståndet är och hur god prognosen ter sig. Möjlighet att få ventilera problemet kan i sig fungera terapeutiskt.

Nyfödda barn sover i genomsnitt 16–18 timmar/dygn. Redan under de första levnadsmånaderna etableras en dygnsrytm med mer sömn nattetid och mindre dagtid. Först vid fyra års ålder är barnet vaket mer än det sover under dygnet. De individuella variationerna i hur mycket ett äldre barn sover är mycket stora.

Spädbarnet passerar igenom en sömncykel snabbare än en vuxen och har också en större andel yttlig REM-sömn. Spädbarnet sover yttligt både oftare och under längre tid än en vuxen. Det som skiljer de barn som sover bra från dem som sover dåligt är att barnen själva kan lugna sig till en ny sömncykel.

Ett barn som är ”övertrött” har svårare att somna. Vila på dagen ger bättre nattsömn. Man vinner inget på att hålla barnet uppe längre på kvällen. För att barnet ska kunna sova krävs ett visst mått av lugn. Påfrestningar i familjen kan göra det svårt att ge detta lugn. Insatserna kan då behöva inriktas på att minska effekterna av familjepåfrestningarna. Att se till att föräldern/föräldrarna får vila en natt är värdefullt, innan krisen blir för svår. Ett bra råd är att ta hjälp av närstående familjemedlemmar eller nära vänner. En kontakt med BVC-psykolog kan ofta hjälpa föräldrarna vid svåra sömnproblem hos barnet.

Goda råd vid sömnproblem

Kopplingen mellan mat och sömn behöver ofta brytas. Det kan vara möjligt från 3–4 månaders ålder. Låt det gå minst en halvtimme efter ett mål innan barnet läggs i sängen.

Ha en kvällsritual som förälder och barn följer varje kväll. Barnet ska slappna av och lugna ner sig. Barnet läggs då vaket i sängen efter en stunds kroppskontakt.

Barnet måste förstå att föräldern finns även om hon/han inte finns i barnets synfält. Om barnet skriker, lugnas det med några lugnande ord och genom att föräldern stillsamt smeker barnet, men nödvändigtvis inte genom att föräldern tar upp det. Barnet ska inte ignoreras. Om barnet skriker igen, ska föräldern komma tillbaka efter en kort stund och trösta igen.

Det är mycket sällan aktuellt med läkemedel mot sömnproblem.

Hudproblem

Se även kapitlet Hudsjukdomar. För närmare information om behandling av olika infektioner i huden rekommenderas behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket (5).

Navelvård

Normal navel

En normal navel tvättas dagligen med hjälp av en kompress eller bomullspinne (tops) och ljummet vatten och torkas därefter.

Smetig och illaluktande navel

Om naveln blir smetig och illaluktande tvättas den ren med klorhexidinsprit, 5 mg/ml. Observera att alsolsprit inte ska användas! Om klorhexidin används för navelvård på premature barn ska försiktighet iakttagas. Föräldrarna får råd om navelvården och åtgärden följs upp av sjuksköterska på BVC.

Vid smetig och illaluktande navel med tilltagande rodnad av omgivande hud samt eventuell feber och allmänpåverkan ska navelinfektion (omfalit) misstänkas. Barnet remitteras akut till barnläkare eftersom det finns risk för sepsis.

Vätskande navel

Om naveln vätskar kan orsaken vara kvarstående rester av gångar (omfalomesentericus respektive urachus) från fostertiden. Barnet ska remitteras till (barn)kirurgisk klinik.

Blödande navel

Det är vanligt att naveln blöder lite efter det att navelstumpen fallit av. Detta behöver mycket sällan åtgärdas.

Navelgranulom

Navelgranulom visar sig som en gråvit hård tapp som kvarstår sedan navelstumpen fallit av och behandlas med fysiologisk koksaltlösning. Naveln tvättas med tops 1–3 gånger/dag varefter de flesta granulom försvinner inom 3 veckor. Om granulomen kvarstår efter denna behandling kan silvernitrattsticka eller Dermovat användas (se Rikshandboken-bhv.se).

Toxiskt utslag – erythema toxicum

Upp mot 50–70 % av alla nyfödda får toxiskt utslag. Dessa hudförändringar kommer kort efter födelsen när barnet är 1–4 dagar gammalt. Det visar sig som röda, oregelbundna utslag av varierande storlek, 2–10 mm. Oftast ser eller känner man små knottror, 1–2 mm stora, som blir gulvita när man trycker på huden. Knottorna kan också likna små varblåsor, men de är inte infekterade. Utslagen är spridda framför allt på bålen och ibland även till armar, lår och ansikte. Orsaken är okänd. Hudförändringarna försvinner av sig själva efter några dagar till veckor.

Milier

Milier visar sig som mycket små, vitaktiga knottror, framför allt på näsan hos nyfödda. Uppkomstmekanismen är okänd och knottorna försvinner spontant utan behandling inom ett par veckor.

Blöjdermatit

Blöjeksem har blivit mindre vanligt i takt med att blöjorna blivit allt bättre men förekommer fortfarande och kan bli ett stort problem. Blöjeksem uppstår när huden är utsatt för fukt, urin, avföring eller tvätt och är instängd i ett lufttätt system under blöjan. I denna fuktiga och varma miljö trivs även jästsvamp (Candida) vilket kan förvärra eksemet ytterligare.

Blöjeksemet yttrar sig som rodnade, torra förändringar, speciellt på de hudtytor som har närmast kontakt med blöjan. Om det dessutom växer jästsvamp i eksemet blir huden ilsket röd, delvis macererad och glansig längst in i hudveckan. För behandling, se Terapirekommendation 1.

Terapirekommendation 1. Behandling av blöjdermatit

Generellt	Lufta av stjärten ofta, det vill säga låt barnet vara utan blöja så mycket som möjligt, hellre timmar än minuter. Byta blöja ofta och använd högabsorberande blöjor.
Enbart rodnad hud	Smörj med neutrala barnsalvor, eventuellt hydrokortison lokalt. Använd skyddande salva som innehåller zink.
Sårig och vätskande hud	Badda med alsollösning 1 %, låt lufttorka. Ge svampdödande medel (imidazol-derivat) lokalt, vid uttalad inflammation i kombination med hydrokortison.
Varig sekretion, varblåsor, smetiga krustor och sprickor	Tvätta med koksallösning eller alsollösning 1 %. Vid uttalade besvär ges behandling med retapamulin som appliceras i ett tunt lager 2 gånger/dag i 5 dagar (bör inte användas om barnet är yngre än 9 månader). Alternativ behandling är väteperoxidkräm som påstrykes 2 gånger/dag tills utläkning har skett.
Vid utbredd infektion	Överväg, efter odling, peroral antibiotikabehandling med cefadroxil alternativt flukloxacillin.

Skorv – seborroiskt eksem i hårbotten

Mjölkskorv, eller gnejs, kallas ett tillstånd med gulaktiga, fjäl-lande hudförändringar i hårbotten vilket ses hos många barn, framför allt spädbarn.

Behandlingen är väsentligen indicerad av kosmetiska skäl. I lindriga fall behövs ingen behandling. Den traditionella behandlingen är insmörjning av hårbotten med salicylsyrevaselin 1 % som får verka några timmar eller över natten, varefter fjäl- len försiktigt kammats bort före schamponering, se Infantilt seborroiskt eksem. Alternativt används i stället en fet kräm, till exempel Locobase Repair. En annan behandlingsform är insmörjning med Essex kräm som får verka under 2 timmar innan håret tvättas med Fungoral schampo. Boragoolja (Borago-kräm, handelsvara) har visat sig ha mycket god effekt på skorv. Smörjs in i hårbotten 3 gånger dagligen i 8–10 dagar.

Atopiskt eksem

Atopiskt eksem är den vanligaste formen av eksem hos barn och drabbar ungefär vart femte barn. Denna eksemform beror på vissa medfödda anlag och har en koppling till andra allergiska symtom, varför det ofta finns allergi i släkten. Barn med atopiskt eksem löper en ökad risk att få luftvägsallergi senare i livet. Under spädbarnsåret lokaliserar eksemet främst till ansiktet, särskilt kinderna, extremiteternas sträcksidor och bälgen, medan det senare under småbarnsåren sker en ändrad lokalisering till böjveck (armar och knän), runt hand- och fotleder, till halsen och huden bakom örsnibbarna.

Huvudsymtomet är klåda, som kan vara svår och inte så sällan leda till sömnproblem. Klådan orsakar i sin tur att barnet river sig, vilket innebär en risk för bakteriell sekundärinfektion. Bakteriella agens är ofta stafylokocker, mer sällan betahemolytiska streptokocker.

Barnen har ofta generellt torr hud och ökad känslighet för irriterande ämnen som tvål, vatten, ylle etc.

I cirka 10 % av fallen med måttligt eksem och i hälften av fallen med svårt eksem finns en bakomliggande födoämnesallergi. De vanligaste allergiframkallande födoämnen är ägg och mjölk. Ämnen från dessa livsmedel kan överföras via moderns bröstmjolk och ge upphov till eksem eller andra allergiska manifestationer redan under amningstiden. Multipel födoämnesallergi bör utredas av barnläkare.

Några födoämnen, som citrusfrukter, viss choklad, konserveringsmedel, starka kryddor, röda eller orange frukter, grönsaker och bär kan ge upphov till överkänslighet. Sådan överkänslighet är inte allergisk och ger aldrig upphov till svåra reaktioner. Den kan inte påvisas i test. Försämringar ses ofta vid förkylningar medan eksem ofta förbättras sommartid.

Behandling

Grunden i behandlingen, utöver elimination av eventuella allergener i kosten, är att bevara huden intakt och minska klådan. För lindriga, torrsprickiga eksem räcker det ofta med mjukgörande salvor, men eksem som är rött och kliar bör behandlas med glukokortikoider i salvor eller krämer. Det är viktigt att förstå att anlaget naturligtvis inte kan tas bort, utan följer barnet under uppväxten. Se vidare i Terapirekommendation 2.

Terapirekommendation 2. Råd vid atopiskt eksem

Allmänna råd	<ul style="list-style-type: none"> • Undvik för mycket tvål och vatten samt kläder som irriterar huden. • Ha badolja i badvattnet. • Använd mjukgörande salvor eller krämer dagligen. Obs! Behandlande läkare ska skriva ut tillräckliga mängder av dessa. Lär ut noggrann smörjning genom att massera in krämen. Undvik karbamid tillsats som ofta svider. • Ett icke-medikamentellt alternativ till lokal steroidbehandling till barn med svåra eksem är underkläder och nattkläder av ett specialvävt sidenmaterial.
Lindrigt eksem med klåda	<ul style="list-style-type: none"> • Lokal behandling med hydrokortison, 2 gånger/dag. Några dagars behandling med grupp II-steroid kan vara aktuellt för att få bort klådan. • Tunna vantar, till exempel av bomull, nattetid kan minska risken för infektion vid svårt kliande eksem. Ett klädstillande antihistamin, till exempel klemastin, kan under en period ges till natten för att minska klådan.
Uppblossning av eksemet	<ul style="list-style-type: none"> • Vid uppblossning av eksemet kan lokal behandling med grupp II–III-steroid vara motiverad under 1–2 veckor med nedtrappning till hydrokortison. Till spädbarn bör man endast använda salvor med steroider ur grupp I med tillägg av grupp II under kort tid på de svåraste ställena. I ansiktet, och speciellt kring ögon och mun, bör enbart grupp I användas.
Sekundärinfektion	<ul style="list-style-type: none"> • Vid misstanke om sekundärinfektion kan peroralt antibiotikum verksamt mot stafylokocker, till exempel cefadroxil, övervägas.

Infantilt seborroiskt eksem

Den viktigaste differentialdiagnosen till atopiskt eksem är infantilt seborroiskt eksem. Denna typ av eksem debuterar vanligen under barnets första levnadsmånad och spontanläker ofta före 6 månaders ålder. Barnen har rodnade, fjällande fläckar i hårbotten, ibland även med spridning till ansiktet, bakom öronen och i hudveck, till exempel i axillerna och blöjregionen. Förändringarna kliar inte. Se även Skorv - seborroiskt eksem i hårbotten.

Behandling

Avfällning av hårbotten med salicylsyrevaselin 1 %. Eventuellt ges hydrokortison lokalt, 2 gånger/dag. På kroppen kan svampmedel som Daktacort eller Cortimyk användas.

Infektioner i huden

För närmare information om behandling av olika infektioner i huden rekommenderas behandlingsrekommendationen från Läke-medelsverket (4).

Impetigo

Impetigo orsakas av stafylokocker eller streptokocker och har ett typiskt utseende med gulaktiga blåsor och sår runt näsa och mun. Blåsor kan även finnas på händerna, runt naglarna eller på kroppen. Barnen får sällan feber.

Behandling och hygienråd

Sårskorporna tvättas bort med tvål och vatten och huden behandlas med i första hand retapamulinsalva (bör dock inte ges till barn yngre än 9 månader) i 5 dagar. Fucidinsalva ska undvikas på grund av risk för resistensutveckling. Vid stor utbredning kan peroral antibiotika ges, till exempel cefadroxil eller flukloxacillin.

Impetigo smittar så länge såret vätskar och barnet ska därför undvika närbildkontakt med andra barn tills såret torkat.

God handhygien är oerhört viktig vid impetigo, både för de infekterade barnen och de vuxna som sköter dem. Använd engångshanddukar och rengör leksaker, handtag och annat som kommit i kontakt med infekterade händer.

Stjärtfluss (perianal streptokockdermatit)

Med ”stjärtfluss” avses ett rodnat och ömmande välavgränsat hudområde runt anus och i vulva hos små barn. Hos små flickor ser man ibland även flytning. Barnet har inga allmänsymtom eller feber. Man kan ofta hitta streptokockinfektion hos annan familjemedlem samtidigt.

Diagnosen bekräftas genom odling, alternativt med snabbtest för streptokocker, från området. Oftast är det streptokocker som är orsaken till problemet men även Haemophilus influenzae-infektioner kan förekomma.

Behandling

Fenoximetylpenicillin (penicillin V) 50–75 mg/kg kroppsvikt/dygn fördelat på 3 doser i 10 dagar, alternativt cefadroxil 25 mg/kg kroppsvikt/dygn fördelat på 2 doser i 5 dagar.

Nagelbandsinfektion – paronyki

Nagelbandsinfektion är vanlig under barnets första levnadsveckor och visar sig som en svullen, rodnad nagelvall. Orsaken är oftast stafylokocker eller streptokocker. Tillståndet har oftast ett lindrigt förlopp, men kan utvecklas till allvarlig septisk infektion.

Behandling

Tvättas med koksalt- eller alsollösning. Vid spridning av infektionen och/eller allmänpåverkan tas ställning till behandling med perorala antibiotika (till exempel cefadroxil) eller remiss till sjukhus.

Födelsemärken**Café-au-lait-fläckar**

Dessa fläckar är gulbruna födelsemärken som kan finnas hos spädbarn, men även bli mera synliga senare under barnåren. De kan inte maligniseras och saknar som regel betydelse.

Barn med många eller ovanligt stora café-au-lait-märken bör dock bedömas av barnläkare.

Kapillära - kavernösa hemangiom

Under det första levnadsåret och särskilt de första levnads-månaderna kan blodkärlen under huden plötsligt börja växa okontrollerat inom ett begränsat område. Kapillära kavernösa hemangiom, som även kallas för smultronmärke, uppkommer plötsligt och kan sitta var som helst på kroppen. Hemangiomet växer ofta hastigt i början och visar sig som en mörkröd, upphöjd, mjuk knuta som kan variera i storlek från någon centimeter upp till över en decimeter. Förändringen finns inte hos nyfödda, men ibland kan man genom en viss färgskiftning i huden förutspå att ett smultronmärke kommer att uppstå på detta ställe.

Vanliga platser för hemangiom är i ansikte och bål. När hemangiomet sitter helt eller delvis under huden kan det skyms som en rödblå förändring.

Smultronmärket ger inga speciella symtom. Om det sitter på ett olyckligt ställe kan det dock medföra stora problem. I närheten av ögat kan det hindra synen, vilket kan leda till kvarstående nedsatt syn eller till och med blindhet. Om hemangiomet sitter nära munnen kan det förhindra barnets amningsförmåga och eventuellt störa barnets normala tillväxt. I underlivet kan ofta problem med blödningar och smärta uppstå när barnet kis-sar eller bajsar.

Behandling

Ett smultronmärke tillbakabildas alltid av sig självt. Tillbakabildningen börjar som en ljusgrå färgförändring i hemangiomet mitt. Det kan ta från ett par månader till flera år innan det har försvunnit. De flesta hemangiom är borta före 3–4 års ålder och nästan alla före 7 års ålder. Man kan därefter ofta se en ljus fläck på platsen där märket har suttit.

När smultronmärket sitter någon annanstans än vid ögonen, munnen eller underlivet låter man knutan tillbakabildas av sig själv. Om det sitter i något av de känsliga områdena ska barnet bedömas av barnläkare eller hudläkare så fort som möjligt. Behandling sker oftast med betablockare eller laser.

Storkbett

Storkbett är en mycket vanlig, medfödd röd hudförändring i pannan och i nacken (engelska "angel's kiss"). Rodnaden orsakas av att det finns många mycket små, tunna och ytliga blodkär i huden. Ett storkbett försvinner av sig självt under det första levnadsåret.

Kärmissbildning/naevus flammeus

Kärmissbildningen finns vid födelsen och kan sitta var som helst på kroppen. Den visar sig som en ljus- eller mörkröd fläck i hudens plan och förekommer i många olika storlekar. Vid vissa förändringar i ansiktet kan även invärtes kärmissbildningar förekomma.

Hudförändringarna vid naevus flammeus kvarstår hela livet och växer i takt med barnet. Vid större förändringar eller om kärmissbildningen sitter på synlig plats bör hudläkare i tidig ålder ta ställning till behov av laserbehandling.

Pigmenterade nevus

Svarta eller mörkbruna nevus tillbakabildas inte utan finns kvar under resten av livet. Risken för malignisering före puberteten är ytterst liten. Nevus på fotsulor, handflator och på hudställen som utsätts för skavning behöver i motsats till vad man tidigare rekommenderat inte längre tas bort. Det är dock viktigt att barnet undviker att exponeras för alltför starkt solljus. Föräldrar bör instrueras om hur malignisering av pigmenterade nevus kan se ut: snabb tillväxt, färgväxling, asymmetri och oklara gränser. Sådana pigmentnevus bör opereras bort liksom de som växer hastigt eller ger ständiga krustor eller ulcerationer.

Ögonproblem

Se även kapitlet Ögonsjukdomar.

Akut konjunktivit

Akut konjunktivit är oftast en del i en virusutlöst övre luftvägsinfektion och behandlas genom att sekret från ögonlockskanterna torkas bort med en bomullstuss indränkt i ljummet vatten upprepade gånger dagligen. Torkningen ska ske inifrån och ut! Om den variga sekretproduktionen inte avtagit efter en vecka finns risk för att infektionen är bakteriell. Behandling bör då ske med antibiotikasalva lokalt (fusidinsyra, kloramfenikol).

Vid ständigt tårflöde och ensidiga eller upprepade variga konjunktiviter kan barnet ha tårvägsstenos. Föräldrarna ges rådet att massera över tårsäcksområdet och hålla ögonen rena. Tillståndet går ofta över spontant. Om besvären kvarstår efter 1 års ålder bör barnet bedömas av ögonläkare.

Konjunktivit hos nyfödda är ofta av mer allvarlig art. Gonokocker kan ge en allvarlig infektion i ögat och debuterar ofta under de första levnadsdygnen. Konjunktivit orsakad av klamydia ger ofta symtom vid 1–2 veckors ålder, aldrig före 5 dagars ålder. Vid misstanke om konjunktivit orsakad av dessa bakterier ska kontakt tas med ögonklinik.

Missbildningar/ förändringar i yttre genitalia

För indikation och tidpunkt för remiss av olika testikelabnormiteter till kirurgisk klinik, se Tabell 1.

Fimos

Trång förhud hos pojkar är vanligt men om pojken inte har besvär kan man avvakta med åtgärd tills början av tonåren. Förhuden kan då vara som ett stramt band runt förhudsöppningen. Man ser bara en nåltunn öppning. När pojken kissar blåser förhuden ibland upp sig som en ballong.

Om pojken har upprepade balaniter, besvär vid miktion, inte kan kissa med god stråle eller har recidiverande urinvägsinfektioner, bör man ta ställning till behandling. I första hand kan man hos barn > 3 år försöka att lösa den bandformiga förträngningen med lokalbehandling. Man smörjer då pojkens förhud med klobetasol (Dermovat kräm) i minst 4 veckor. Om detta inte hjälper bör pojken remitteras till kirurg för operation, så kallad förhudsplastik.

Synekier mellan preputium och glans penis

Det är vanligt att det under uppväxten finns sammanväxningar mellan pojkens ollon och förhud. Detta är att betrakta som ett normaltillstånd och behöver inte behandlas. Vid enstaka tillfällen, som vid upprepade balaniter, kan denna sammanväxning behöva åtgärdas genom lösning i narkos.

Balanit

Balanit är en infektion under förhuden med rodnad och svullnad av penisspetsen, ibland hela penis. Oftast är trång förhud den utlösande orsaken. Pojken har ingen feber eller allmänpåverkan och antibiotikabehandling eller odling krävs normalt inte.

Balanit behandlas med koksaltspolning, vilket smidigt kan göras via en venflon som man dragit ut nålen ur alternativt med hjälp av plastspruta, 5 ml, där spetsen förs in i öppningen och man spolar rent. Man kan sedan följa upp med sittbad i ljummet vatten i hemmet.

Efter flera balaniter bör behandling/operation av eventuell fimos övervägas.

Retentio testis

Vid födelsen har cirka 5 % av pojkarna retentio testis, medan andelen vid ett halvt års ålder endast är 1–2 %. Pojkar som vid 5–6 månaders ålder har retentio testis ska remitteras till kirurg och opereras före 12 månaders ålder. Om man upptäcker retentio hos ett äldre barn remitteras det genast för operation.

Tabell 1. Indikation och tidpunkt för remiss av olika testikelabnormiteter till kirurgisk klinik

Fynd	Ålder vid remiss
Testiklar saknas helt på båda sidor	Neonatalt eller vid senare fynd
Testiklar kan inte fås ned ur ljumskan samt ovanligt liten penis eller annan avvikelse	Neonatalt eller vid senare fynd
Testikel kan inte fås ned i pungens botten eller fjädrar snabbt upp igen	Vid 5–6 månader eller vid senare fynd
Osäkert fynd vid upprepade kontroller	Vid 5–6 månader eller vid senare fynd

Vulvasynekier

Vulvasynekier (sammanväxningar mellan labia majora) är normalt hos flickor i förskoleåldern och löses oftast spontant vid 7–8 års ålder. Oftast behövs ingen behandling.

Vid lokal irritation eller recidiverande urinvägsinfektioner kan behandling ske med östrogensalva som smörjs 1 gång/dag med en tops eller ett finger över synekien. Det lilla tryck som då uppstår mot den tunna synekien bidrar till att den släpper efter någon eller några veckor. Behandlingen ska fortsätta dagligen ytterligare någon vecka och därefter 1 gång/vecka i ytterligare 3 veckor. Biverkning av denna behandling, som ibland kan ses, är något svullna labia. Regress av svullnaden sker när behandlingen avslutats. När synekierna lösts är det viktigt att smörja blygdläpparnas insida med mjuk kräm eller olja för att förhindra ny sammanväxning.

Ortopediska problem

På BVC ingår också att titta på barnens fötter, ben och rygg. Remiss till ortoped/ bandagemästare var tidigare vanliga åtgärder, men behövs numera alltmer sällan då man vet att det mesta ”rättar till sig”. Bra tips om denna problematik finns i Rikshandboken för barnhälsovård med länkar till specifika problem.

Referenser

- Hauck FR, Thompson JM, Tanabe KO, Moon RY, Vennemann MM et al. Breastfeeding and reduced risk of sudden infant death syndrome: a meta-analysis. *Pediatrics*. 2011 Jul; 128(1): s 103-10. *Pediatrics*. 2011;128:103-10.
- Savino F, Cordisco L, Tarasco V, Palumeri E, Calabrese R et al. *Pediatrics*. 2010;126:e526-33.
- Indrio F, Di Mauro A, Riezzo G, Civardi E, Intini C et

al. JAMA Pediatr. 2014;168:228-33

4. Behandlingsrekommendation - Hud- och mjukdelsinfektioner. Information från Läkemedelsverket 5:2009.

För vidare läsning

- a. Rikshandboken för barnhälsovård
- b. Svenska barnläkarföreningen
- c. Dermatology Information System (DermIS)
- d. Norgren S, Ludvigsson JF, Norman M, red. Akut pediatrik. Stockholm: Liber AB; 2010. ISBN 9789147094028
- e. Livsmedelsverket
- f. Moëll C, Gustafsson J. Pediatrik, bok med eLabb. 1:a uppl. Liber; 2011. ISBN 9789147103454.
- g. Hanséus K, Lagercrantz H, Lindberg T, red. Barnmedicin. 4:e uppl. Studentlitteratur AB; 2012. ISBN 9789144076096.
- h. Pediatrik, bok med eLabb. Moëll C, Gustafsson J, red. Bok+IT-stöd. Liber AB. 2011. ISBN 9789147103454.

© Läkemedelsverket | Senast ändrad: 2018-03-22 13:16